

TEHAMA COUNTY HEALTH SERVICES AGENCY

MICHELLE SCHMIDT, PHN
INTERIM EXECUTIVE DIRECTOR

ROSA CUMPSTON
ASSISTANT EXECUTIVE

TIMOTHY D. PETERS, MD
HEALTH OFFICER



MINNIE SAGAR, MPH, MPA
PUBLIC HEALTH DIRECTOR
1860 WALNUT STREET, BUILDING D
MAILING ADDRESS: PO BOX 400, RED BLUFF, CA 96080

(530) 527-6824
FAX (530) 527-0362

July 15, 2026

PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT

Rabies Found in Bats

In Tehama County, we have recently had two bats found in residential areas that tested positive for rabies. Rabies is a deadly viral disease that can affect both humans and animals, but exposure can often be prevented through awareness, safe practices, and keeping pets vaccinated. The information below is intended to provide important guidance on reducing the risk of rabies exposure and understanding the appropriate steps to take if an exposure occurs.

How can rabies be prevented?

- Do not handle, feed, or attempt to capture any unfamiliar/stray/wild animals including bats, feral or stray cats.
- If doing outdoor activities with pets, keep your animals on a leash and do not let them interact with any wild or unknown animals in these areas.
- Teach children not to handle unfamiliar animals, even if they seem friendly. "Love your own, leave other animals alone" is a good principle for children to learn.
- Wash any wound from an animal thoroughly with soap and water and seek medical attention immediately.
- Be a responsible pet owner by keeping pet vaccinations current. Rabies vaccines are administered by a veterinarian, you cannot get it from a retailer or a feed store.
- If you see a wild animal in distress, diseased, or appears to be injured submit a wildlife incident report with the California Department of Fish and Game at <https://apps.wildlife.ca.gov/wir/incident/create>
- If you see a domesticated animal in distress, diseased, or appears to be injured contact the Tehama County Sheriff's Department at 530-529-7900.
- You can visit <https://tehamaso.org/animal-regulations/> for more information about reporting a nuisance or potentially dangerous dog, pet regulations, license, spay & neutering, leashing your dog, and frequently asked questions.
- If you have been bitten or exposed to a suspected rabid animal contact Tehama County Health Services Agency Public Health at 530-527-6824.

Rabies can be a fatal disease that is preventable. It is a viral disease of mammals most often transmitted to humans and other animals from the bite of a rabid animal. The rabies virus infects the central nervous system, including the brain. Early symptoms of rabies in humans include fever, headache, and generally feeling unwell. As the disease progresses, other symptoms appear such as insomnia, anxiety, confusion, slight or partial paralysis, excitation, hallucinations, agitation, drooling, difficulty swallowing, and hydrophobia (fear of water). Death usually occurs within days of the onset of symptoms.

Most rabies cases reported to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) each year occur in wild animals such as bats, raccoons, skunks, and foxes. Domestic animals account for less than 10% of the reported rabies cases with dogs, cattle, and cats most often reported infected. Wild animals, especially bats, are the most common source of human rabies infection in the United States. In Tehama County, rabies in bats is widespread.

Most people believe that rabid animals can easily be spotted because they drool excessively and foam at the mouth. However, most animals will display these symptoms only in the latter stages of infection, if at all. A better way to identify animals that pose a risk is to recognize unusual or abnormal behavior. Rabid animals, wild or domestic, may stagger, appear restless, be aggressive, change the tone of their barks or growls, or appear to be choking. Wild animals sometimes lose their fear of humans and act friendly. Animals that are usually active at night may become active during the day. Passive animals sometimes become fierce and aggressive.

How is rabies treated?

- Some people are afraid to seek treatment for exposure to rabies because they have heard about a long series of painful shots in the stomach. However, this is no longer the case. Treatment now consists of a series of four injections over a two-week period that are administered in the arm. An injection of anti-rabies immunoglobulin is also administered on the day of the first vaccination to boost the immune system with immediate antibodies to rabies, giving the vaccine time to induce the person's antibodies over time.
- Most people do not react adversely to the rabies vaccine, but there may be some swelling, redness, or soreness at the injection site.
- The anti-rabies treatment with vaccine and immunoglobulin has proven 100% effective if started within 14 days of exposure.

For more information, contact Tehama County Health Services Agency – Public Health Division (530) 527-6824

TEHAMA COUNTY HEALTH SERVICES AGENCY

MICHELLE SCHMIDT, PHN
INTERIM EXECUTIVE DIRECTOR

ROSA CUMPSTON
ASSISTANT EXECUTIVE

TIMOTHY D. PETERS, MD
HEALTH OFFICER



MINNIE SAGAR, MPH, MPA
PUBLIC HEALTH DIRECTOR
1860 WALNUT STREET, BUILDING D
MAILING ADDRESS: PO BOX 400, RED BLUFF, CA 96080

(530) 527-6824
FAX (530) 527-0362

15 de julio de 2026

ANUNCIO DE SERVICIO PÚBLICO

Rabia encontrada en murciélagos

En el condado de Tehama, recientemente se encontraron dos murciélagos en áreas residenciales que dieron positivo por rabia. La rabia es una enfermedad viral mortal que puede afectar tanto a las personas como a animales. Sin embargo, la exposición a la rabia muchas veces se puede prevenir con información, prácticas seguras y manteniendo a las mascotas vacunadas. La información a continuación tiene el propósito de brindar orientación importante para reducir el riesgo de exposición a la rabia y ayudarle a saber qué hacer si ocurre una posible exposición.

¿Cómo se puede prevenir la rabia?

- No manipules, alimentes ni intentes capturar animales desconocidos/callejeros/salvajes, incluyendo murciélagos, o gatos callejeros.
- Si usas actividades al aire libre con mascotas, mantén a tus animales con correa y no dejes que interactúen con animales salvajes o desconocidos en esas áreas.
- Enseña a los niños a no manipular animales desconocidos, aunque parezcan amigables. "Ama a los tuyos, deja en paz a otros animales" es un buen principio para que los niños lo aprendan.
- Lava a fondo cualquier herida de un animal con agua y jabón y busca atención médica de inmediato.
- Sé un dueño responsable manteniendo las vacunas actualizadas. Las vacunas contra la rabia son administradas por un veterinario, no puedes obtenerlas en una tienda o en una tienda de alimentos.
- Si ves un animal salvaje en apuros, enfermo o parece estar herido, presenta un reporte de incidente de vida silvestre ante el Departamento de Pesca y Caza de California [en https://apps.wildlife.ca.gov/wir/incident/create](https://apps.wildlife.ca.gov/wir/incident/create)
- Si ves un animal domesticado en apuros, enfermo o parece estar herido, comunícate con el Departamento del Sheriff del Condado de Tehama al 530-529-7900.
- Puedes visitar <https://tehamaso.org/animal-regulations/> para obtener más información sobre cómo reportar a un perro molesto o potencialmente peligroso, regulaciones para mascotas, licencia, esterilización y castración, correa de tu perro y preguntas frecuentes.
- Si has sido mordido o expuesto a un animal sospechoso de rabia, contacta a la Agencia de Servicios de Salud del Condado de Tehama al 530-527-6824.

La rabia puede ser una enfermedad fatal que se puede prevenir. Es una enfermedad viral de mamíferos que suele transmitirse a humanos y otros animales por la mordedura de un animal rabioso. El virus de la rabia infecta el sistema nervioso central, incluido el cerebro. Los primeros síntomas de la rabia en humanos incluyen fiebre, dolor de cabeza y, en general, sentirse mal. A medida que la enfermedad avanza, aparecen otros síntomas como insomnio, ansiedad, confusión, parálisis leve o parcial, excitación, alucinaciones, agitación, babeo, dificultad para tragar e hidrofobia (miedo al agua). La muerte generalmente ocurre a los pocos días de la aparición de los síntomas.

La mayoría de los casos de rabia reportados a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) cada año ocurren en animales salvajes como murciélagos, mapaches, zorrillos y zorros. Los animales domésticos representan menos del 10% de los casos reportados de rabia, y los perros, ganado y gatos son los que más comúnmente se reportan como infectados. Los animales salvajes, especialmente los murciélagos, son la fuente más común de infección por rabia humana en Estados Unidos. En el condado de Tehama, la rabia en murciélagos es muy extendida.

La mayoría de la gente cree que los animales rabiosos pueden ser fácilmente detectados porque babean en exceso y hacen espuma por la boca. Sin embargo, la mayoría de los animales solo muestran estos síntomas en las etapas finales de la infección, si es que los presentan. Una mejor manera de identificar animales que representan un riesgo es reconocer comportamientos inusuales o anormales. Los animales rabiosos, salvajes o domésticos, pueden tambalearse, parecer inquietos, ser agresivos, cambiar el tono de sus ladridos o gruñidos, o parecer que se están ahogando. Los animales salvajes a veces pierden el miedo a los humanos y actúan de manera amigable. Los animales que usualmente están activos por la noche pueden volverse activos durante el día. Los animales pasivos a veces se vuelven feroces y agresivos.

¿Cómo se trata la rabia?

- Algunas personas tienen miedo de buscar tratamiento por la exposición a la rabia porque han escuchado sobre una larga serie de inyecciones dolorosas en el estómago. Sin embargo, esto ya no es así. El tratamiento ahora consiste en una serie de cuatro inyecciones durante un periodo de dos semanas que se administran en el brazo. También se administra una inyección de inmunoglobulina antirrabica el día de la primera vacunación para fortalecer el sistema inmunológico con anticuerpos inmediatos contra la rabia, dando tiempo a la vacuna para inducir los anticuerpos de la persona con el tiempo.
- La mayoría de las personas no reaccionan negativamente a la vacuna contra la rabia, pero puede haber algo de hinchazón, enrojecimiento o dolor en el sitio de la inyección.

- El tratamiento antirrábico con vacuna e inmunoglobulina ha demostrado ser 100% efectivo si se inicia dentro de los 14 días posteriores a la exposición.

Para más información, comuníquese con la Agencia de Servicios de Salud del Condado de Tehama – División de Salud Pública (530) 527-6824